
 **ZURZUVAE**<sup>®</sup>  
(zuranolona) capsules   
20 mg • 25 mg • 30 mg

La depresión posparto  
puede ser abrumadora.

*Pero ya hay esperanza  
con 14 días de  
ZURZUVAE.*

Actor en representación

**ZURZUVAE es el primer y único tratamiento oral aprobado por la FDA para la depresión posparto, que se toma por 14 días.**

### **¿Qué es ZURZUVAE<sup>®</sup> (zuranolona)?**

ZURZUVAE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar la depresión posparto (DPP) en adultos.

Se desconoce si ZURZUVAE es seguro y eficaz para su uso en niños.

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

**¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZURZUVAE?**

**ZURZUVAE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

- **Reducción de la capacidad para conducir o realizar otras actividades peligrosas.** ZURZUVAE puede disminuir la conciencia y el estado de alerta, lo que puede afectar a su capacidad para conducir de forma segura o hacer otras actividades peligrosas
  - **No** conduzca, no opere maquinaria ni realice otras actividades peligrosas **hasta al menos 12 horas después de tomar cada dosis** durante el curso de tratamiento de 14 días con ZURZUVAE
  - Es posible que no pueda saber por su cuenta si puede conducir de forma segura o cuánto le está afectando ZURZUVAE

**Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 14-16, y la Información de Prescripción completa adjunta, incluyendo el Recuadro de Advertencia y la Guía del Medicamento.**



Actor en representación



“ Yo les digo a las mujeres con un diagnóstico de **depresión posparto** que ellas no tienen la culpa de esto. Pedir ayuda puede dar mucho miedo, pero al hacerlo encuentras valentía y coraje. Todavía hay esperanza ”.



–**Bethany**, tratada con ZURZUVAE por DPP tras el parto de su cuarto hijo  
Paciente real remunerado  
*Las experiencias individuales pueden variar.*

## ¿Qué es la **depresión posparto**?

La **depresión posparto (DPP)** es un tipo de depresión cuyos síntomas pueden comenzar durante el embarazo o después del parto. La DPP es diferente de la tristeza posparto o “*baby blues*”, que generalmente mejora dentro de 2 semanas, sin tratamiento. Los síntomas de la DPP son más intensos, duran más tiempo y pueden ser graves si no se tratan. Solo un proveedor de atención médica puede decirte si lo que estás sintiendo es algo más que “tristeza posparto”. Por eso es importante analizar todos los síntomas de inmediato.

## La **depresión posparto** es más común de lo que crees



### Aproximadamente **1 de cada 8 mujeres**

reportan experimentar síntomas de depresión posparto (DPP) después de haber dado a luz.



### La DPP está **subdiagnosticada y poco tratada,**

a pesar de ser una de las afecciones médicas más comunes asociadas al embarazo.



### La DPP puede afectar a **cualquier mujer adulta**

independientemente de su edad, origen étnico, estado civil o nivel de ingresos.

## Existen factores de riesgo asociados a la DPP, que pueden incluir:

- **Mayor estrés**
- **Historial familiar o personal de depresión**
- **Cambios hormonales durante el embarazo**

## ¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas de la **depresión posparto**?

La depresión posparto puede causar un sinnúmero de síntomas. Si bien puede que sientas síntomas diferentes, algunos de los síntomas más comunes incluyen:

- Estado de ánimo persistentemente triste, ansioso o sensación de “vacío” la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas
- Sentimientos de desesperación o pesimismo
- Sentimientos de irritabilidad, frustración o inquietud
- Sentimientos de culpa, inutilidad o impotencia
- Pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades
- Fatiga o reducción anormal de energía
- Sensación de inquietud o tener problemas para quedarte quieta
- Dificultad para concentrarte, recordar o tomar decisiones
- Dificultad para dormir (incluso cuando el bebé está durmiendo), despertarte demasiado temprano o dormir de más
- Anomalías en el apetito o cambios no planificados en el peso
- Dolores físicos, dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos que no tienen causa física evidente o no mejoran con tratamiento
- Dificultad para establecer lazos o formar un vínculo afectivo con el recién nacido
- Dudas persistentes acerca de tu capacidad para cuidar al bebé
- Pensamientos sobre la muerte o de hacerle daño al bebé o a ti misma, o intentos de suicidio

Esto no pretende proporcionar asesoramiento médico. Si tienes preguntas, debes hablar siempre con tu proveedor de atención médica.

Si estás pensando en el suicidio, llama confidencialmente a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al **988**. Si tienes una emergencia médica, llama al **911**. Si temes por tu seguridad o la de tu hijo, busca ayuda inmediatamente.

**Consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 14-16, y la Información de Prescripción completa adjunta, incluyendo el Recuadro de Advertencia y la Guía del Medicamento.**

## Rápido alivio que podría comenzar en 3 días

En un estudio clínico, ZURZUVAE brindó una forma rápida de sentir alivio de los síntomas



### Rápido alivio

Las mujeres sintieron mejoría de los síntomas de la DPP el **Día 15** e incluso desde el **Día 3**.



### Resultados que perduraron

Las mujeres continuaron sintiendo alivio durante aproximadamente 4 semanas después de haber terminado de tomar ZURZUVAE.

### Se estudió ZURZUVAE de 50 mg o placebo en mujeres con DPP

- Cuyos síntomas comenzaron en el tercer trimestre o dentro de las 4 semanas después del parto en un estudio de 6 semanas
- Durante el estudio, las pacientes tomaron ZURZUVAE o placebo durante 14 días y se les realizó un seguimiento durante otras 4 semanas
- Se demostró una mejoría de los síntomas de DPP significativamente mayor el **Día 3**, el **Día 15** (variable principal) y el **Día 45** en comparación con el placebo, usando una escala de calificación de depresión estándar



Paciente real remunerado



“ Con ZURZUVAE, empecé a notar de verdad una mejoría en mi estado de ánimo probablemente al tercer o cuarto día... las personas notaban una diferencia ”.

–**Bethany**, tratada con ZURZUVAE por DPP tras el parto de su cuarto hijo

*Las experiencias individuales pueden variar.*

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZURZUVAE?

ZURZUVAE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:



- **Disminución de la conciencia y el estado de alerta [efectos supresores del sistema nervioso central (SNC)].** ZURZUVAE puede provocar somnolencia, adormecimiento, pensamiento lento, mareos, confusión y problemas para caminar.
  - Debido a estos síntomas, puede tener un mayor riesgo de caídas durante el tratamiento con ZURZUVAE
  - Tomar alcohol, otros medicamentos que causan efectos supresores del SNC u opioides mientras se toma ZURZUVAE puede empeorar estos síntomas y también puede causar problemas para respirar
  - Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de estos síntomas o si estos síntomas empeoran durante el tratamiento con ZURZUVAE. Su proveedor de atención médica puede disminuirle la dosis o interrumpir el tratamiento con ZURZUVAE si usted desarrolla estos síntomas

ZURZUVAE es una sustancia controlada por el gobierno federal (C-IV) porque contiene zuranolona, que puede llevar al desarrollo de abuso o dependencia. Mantenga ZURZUVAE en un lugar seguro para evitar robo. No venda ni regale ZURZUVAE, porque puede dañar a otras personas y va en contra de la ley.


**Antes de tomar ZURZUVAE, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:**

- bebe alcohol
- ha tenido abuso o dependencia de medicamentos con receta, drogas ilícitas o alcohol
- tiene problemas de hígado o de riñón
- está embarazada o planea quedar embarazada. ZURZUVAE puede causarle daño al bebé en gestación
- está amamantando o planea amamantar. ZURZUVAE pasa a la leche materna y se desconoce si puede dañar a su bebé. Hable con su proveedor de atención médica sobre los riesgos y beneficios de la lactancia y sobre la mejor forma de alimentar a su bebé durante el tratamiento con ZURZUVAE

**Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 14-16, y la Información de Prescripción completa adjunta, incluyendo el Recuadro de Advertencia y la Guía del Medicamento.**

 **ZURZUVAE**  
(zuranolone) capsules   
20 mg • 25 mg • 30 mg

## 14 días de dosis y eso es todo con ZURZUVAE



### Tómalo una vez al día con alimentos

Toma ZURZUVAE una vez diariamente con alimentos que contengan grasa.

¿Buscas ideas sobre qué comer?

Conversa con tu proveedor de atención médica para recibir orientación e infórmale sobre cualquier alergia alimentaria que tengas.



### Tómalo por la noche

Toma ZURZUVAE exactamente como tu proveedor de atención médica lo indique. Conversa con tu proveedor de atención médica sobre la hora más adecuada para tomar ZURZUVAE, ya que puede causar somnolencia.

**No conduzcas ni realices actividades peligrosas durante al menos 12 horas después de tomar cada dosis de ZURZUVAE.**



### Tómate el tratamiento durante los 14 días

Aunque comiences a sentirte mejor antes, debes terminarte todo el medicamento que te recetaron, a menos que tu proveedor de atención médica te indique lo contrario.

## Algunas cosas para recordar cuando empieces a tomar ZURZUVAE



### Tómalo exactamente como lo haya indicado el médico

Tu proveedor de atención médica puede cambiarte la dosis de ZURZUVAE si experimentas ciertos efectos secundarios. No cambies tu dosis sin hablar con tu proveedor de atención médica.



### ¿No tomaste una dosis?

Si omitiste una dosis, sáltate esa dosis omitida y toma la siguiente dosis a la hora habitual. NO tomes cápsulas adicionales para compensar la dosis que no tomaste. Sigue tomando ZURZUVAE una vez al día hasta completar el resto de tu tratamiento de 14 días.



Actor en representación

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

### Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada durante el tratamiento con ZURZUVAE
- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento con ZURZUVAE y durante 1 semana después de la última dosis
- Hay un registro de embarazos para mujeres que están expuestas a ZURZUVAE durante el embarazo. El objetivo del registro es recopilar información sobre la salud de las mujeres expuestas a ZURZUVAE y la de su bebé. Si queda embarazada durante el tratamiento con ZURZUVAE, hable con su proveedor de atención médica sobre cómo registrarse en el Registro Nacional de Embarazos para Antidepresivos llamando al 1-844-405-6185, o visite en línea <https://womensmentalhealth.org/research/pregnancyregistry/antidepressants/>

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. ZURZUVAE y algunos medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios graves. ZURZUVAE puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar el funcionamiento de ZURZUVAE.

**En particular, informe a su proveedor de atención médica si toma antidepresivos, opioides o supresores del SNC, como benzodiazepinas.**

### ¿Qué debo evitar mientras tomo ZURZUVAE?

- **No** conduzca, no opere maquinaria ni realice otras actividades peligrosas **hasta al menos 12 horas después de tomar cada dosis de ZURZUVAE**, ya que ZURZUVAE puede provocarle somnolencia, confusión o mareos
- **No** beba alcohol ni tome otros medicamentos que le provoquen somnolencia o mareos mientras toma ZURZUVAE sin hablar con su proveedor de atención médica


Consulte **“¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZURZUVAE?”**

**ZURZUVAE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

Consulte **“¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZURZUVAE?”**

- **Mayor riesgo de pensamientos o comportamientos suicidas.** ZURZUVAE y otros medicamentos antidepresivos pueden aumentar el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas en personas de 24 años de edad o menos. **ZURZUVAE no se debe usar en niños**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 14-16, y la **Información de Prescripción completa adjunta, incluyendo el Recuadro de Advertencia y la Guía del Medicamento.**

 **ZURZUVAE**  
(zuranolone) capsules <sup>®</sup> <sub>IV</sub>  
20 mg • 25 mg • 30 mg

## Recibiendo ZURZUVAE

Si te recetaron ZURZUVAE, tu medicamento se enviará directamente a tu puerta. ZURZUVAE solo está disponible en farmacias especializadas y será enviado directamente a tu casa porque no se encuentra disponible en farmacias locales.

**Mira un video para aprender cómo se administra ZURZUVAE**

## Aquí tienes ayuda

ZURZUVAE Para Ti es un programa de apoyo al paciente que está aquí para ayudarte en el transcurso de tu tratamiento. ZURZUVAE Para Ti presta servicios a pacientes, incluyendo la ayuda de los Coordinadores de Apoyo que están disponibles para proporcionar información sobre ZURZUVAE y la DPP, y para responder a tus preguntas.

 **ZURZUVAE® PARA TI**  
(zuranolone) capsules   
20 mg • 25 mg • 30 mg

**1-844-987-9882**

## Programas de Asistencia Financiera de ZURZUVAE

Si te han recetado ZURZUVAE para el tratamiento de la depresión posparto (DPP), es posible que existan programas de asistencia financiera, como el Programa de Tarjetas de Ahorro de ZURZUVAE\*, disponibles para ayudarte a acceder a tu medicamento recetado.

**Recuerda que tu proveedor de atención médica es tu mejor fuente de información para cualquier pregunta médica o necesidad de atención médica.**

Si tienes preguntas acerca de la depresión posparto, ZURZUVAE o los servicios y recursos disponibles para brindarte apoyo, llama a la línea de apoyo ZURZUVAE Para Ti al **1-844-987-9882**.

\*La asistencia financiera para pacientes elegibles con seguro privado, en virtud del Programa de Tarjetas de Ahorro de ZURZUVAE, será aplicada directamente por la farmacia especializada que surte la receta. Se aplican restricciones. Consulte los [términos y condiciones](#).



Paciente real remunerado



**“Quiero que las mujeres sepan que no están solas.**

**Muchas mujeres pasan por esto y ya existe un tratamiento oral aprobado para la DPP, ZURZUVAE, que podría ayudar”.**

—**Katlyn**, tratada con ZURZUVAE por DPP en 2021 como parte de un ensayo clínico

*Las experiencias individuales pueden variar.*

**Visita [ZURZUVAE.com/stories](https://www.zurzuvae.com/stories)**

para ver videos sobre mujeres que pasaron por una experiencia similar. (Solo disponibles en inglés)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

### ¿Cómo puedo observar y tratar de prevenir los pensamientos y comportamientos suicidas?

- Preste especial atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos de humor, comportamiento, pensamientos o sentimientos, o si desarrolla pensamientos o comportamientos suicidas. Esto es muy importante cuando se inicia un medicamento antidepresivo o cuando se cambia la dosis
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si experimenta algún cambio nuevo o repentino en el estado de ánimo, el comportamiento, los pensamientos o los sentimientos
- Acuda a todas las visitas de seguimiento con su proveedor de atención médica según lo programado. Llame a su proveedor de atención médica entre las visitas según sea necesario, especialmente si tiene inquietudes sobre los síntomas

### Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas, especialmente si son nuevos, empeoran o le preocupan:



- intentos de cometer suicidio
- pensamientos sobre el suicidio o la muerte
- depresión nueva o empeorada
- sensación de mucha agitación o inquietud
- problemas para dormir (insomnio)
- ansiedad nueva o empeorada
- ataques de pánico
- irritabilidad nueva o empeorada
- comportamiento agresivo, ira o violencia
- aumento extremo de la actividad y el habla (manía)
- actuar por impulsos peligrosos
- otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo

### Los efectos secundarios más frecuentes de ZURZUVAE incluyen:

- Somnolencia o adormecimiento, mareos, resfriado común, diarrea, sensación de cansancio, debilidad o falta de energía e infección de las vías urinarias

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ZURZUVAE. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA en el [1-800-FDA-1088](https://www.fda.gov/medwatch) o en [www.fda.gov/medwatch](https://www.fda.gov/medwatch)

**Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 14-16, y la Información de Prescripción completa adjunta, incluyendo el Recuadro de Advertencia y la Guía del Medicamento.**

 **ZURZUVAE®**  
(zuranolone) capsules   
20 mg • 25 mg • 30 mg

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Qué es ZURZUVAE® (zuranolona)?

ZURZUVAE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar la depresión posparto (DPP) en adultos.

Se desconoce si ZURZUVAE es seguro y eficaz para su uso en niños.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZURZUVAE?

**ZURZUVAE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

- **Reducción de la capacidad para conducir o realizar otras actividades peligrosas.** ZURZUVAE puede disminuir la conciencia y el estado de alerta, lo que puede afectar a su capacidad para conducir de forma segura o hacer otras actividades peligrosas
  - **No** conduzca, no opere maquinaria ni realice otras actividades peligrosas **hasta al menos 12 horas después de tomar cada dosis** durante el curso de tratamiento de 14 días con ZURZUVAE
  - Es posible que no pueda saber por su cuenta si puede conducir de forma segura o cuánto le está afectando ZURZUVAE
- **Disminución de la conciencia y el estado de alerta [efectos supresores del sistema nervioso central (SNC)].** ZURZUVAE puede provocar somnolencia, adormecimiento, pensamiento lento, mareos, confusión y problemas para caminar
  - Debido a estos síntomas, puede tener un mayor riesgo de caídas durante el tratamiento con ZURZUVAE
  - Tomar alcohol, otros medicamentos que causan efectos supresores del SNC u opioides mientras se toma ZURZUVAE puede empeorar estos síntomas y también puede causar problemas para respirar
  - Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de estos síntomas o si estos síntomas empeoran durante el tratamiento con ZURZUVAE. Su proveedor de atención médica puede disminuirle la dosis o interrumpir el tratamiento con ZURZUVAE si usted desarrolla estos síntomas

ZURZUVAE es una sustancia controlada por el gobierno federal (C-IV) porque contiene zuranolona, que puede llevar al desarrollo de abuso o dependencia. Mantenga ZURZUVAE en un lugar seguro para evitar robo. No venda ni regale ZURZUVAE, porque puede dañar a otras personas y va en contra de la ley.

**Antes de tomar ZURZUVAE, informe a su proveedor de atención médica de todas sus afecciones médicas, incluido si:**

- bebe alcohol
- ha tenido abuso o dependencia de medicamentos con receta, drogas ilícitas o alcohol
- tiene problemas de hígado o de riñón
- está embarazada o planea quedar embarazada. ZURZUVAE puede causarle daño al bebé en gestación
- está amamantando o planea amamantar. ZURZUVAE pasa a la leche materna y se desconoce si puede dañar a su bebé. Hable con su proveedor de atención médica sobre los riesgos y beneficios de la lactancia y sobre la mejor forma de alimentar a su bebé durante el tratamiento con ZURZUVAE

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

### Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada durante el tratamiento con ZURZUVAE
- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento con ZURZUVAE y durante 1 semana después de la última dosis
- Hay un registro de embarazos para mujeres que están expuestas a ZURZUVAE durante el embarazo. El objetivo del registro es recopilar información sobre la salud de las mujeres expuestas a ZURZUVAE y la de su bebé. Si queda embarazada durante el tratamiento con ZURZUVAE, hable con su proveedor de atención médica sobre cómo registrarse en el Registro Nacional de Embarazos para Antidepresivos llamando al [1-844-405-6185](tel:1-844-405-6185), o visite en línea <https://womensmentalhealth.org/research/pregnancyregistry/antidepressants/>

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. ZURZUVAE y algunos medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios graves. ZURZUVAE puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar el funcionamiento de ZURZUVAE.

**En particular, informe a su proveedor de atención médica si toma antidepresivos, opioides o supresores del SNC, como benzodiazepinas.**

### ¿Qué debo evitar mientras tomo ZURZUVAE?

- **No** conduzca, no opere maquinaria ni realice otras actividades peligrosas **hasta al menos 12 horas después de tomar cada dosis de ZURZUVAE**, ya que ZURZUVAE puede provocarle somnolencia, confusión o mareos
- **No** beba alcohol ni tome otros medicamentos que le provoquen somnolencia o mareos mientras toma ZURZUVAE sin hablar con su proveedor de atención médica

### ¿Qué debo evitar mientras tomo ZURZUVAE?

Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZURZUVAE?”

**ZURZUVAE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZURZUVAE?”

- **Mayor riesgo de pensamientos o comportamientos suicidas.** ZURZUVAE y otros medicamentos antidepresivos pueden aumentar el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas en personas de 24 años de edad o menos.  
**ZURZUVAE no se debe usar en niños**

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

### ¿Cómo puedo observar y tratar de prevenir los pensamientos y comportamientos suicidas?

- Preste especial atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos de humor, comportamiento, pensamientos o sentimientos, o si desarrolla pensamientos o comportamientos suicidas. Esto es muy importante cuando se inicia un medicamento antidepresivo o cuando se cambia la dosis
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si experimenta algún cambio nuevo o repentino en el estado de ánimo, el comportamiento, los pensamientos o los sentimientos
- Acuda a todas las visitas de seguimiento con su proveedor de atención médica según lo programado. Llame a su proveedor de atención médica entre las visitas según sea necesario, especialmente si tiene inquietudes sobre los síntomas

**Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas, especialmente si son nuevos, empeoran o le preocupan:**



- intentos de cometer suicidio
- pensamientos sobre el suicidio o la muerte
- depresión nueva o empeorada
- sensación de mucha agitación o inquietud
- problemas para dormir (insomnio)
- ansiedad nueva o empeorada
- ataques de pánico
- irritabilidad nueva o empeorada
- comportamiento agresivo, ira o violencia
- aumento extremo de la actividad y el habla (manía)
- actuar por impulsos peligrosos
- otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo


**Los efectos secundarios más frecuentes de ZURZUVAE incluyen:**

- Somnolencia o adormecimiento, mareos, resfriado común, diarrea, sensación de cansancio, debilidad o falta de energía e infección de las vías urinarias

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ZURZUVAE. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA en el [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088) o en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).

**Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluyendo el Recuadro de Advertencia y la Guía del Medicamento.**

 **ZURZUVAE**<sup>®</sup>  
(zuranolone) capsules   
20 mg • 25 mg • 30 mg



Descubre lo que es posible  
con 14 días de ZURZUVAE

Actor en representación

Obtenga más información en [ZURZUVAE.com](https://www.zurzuvae.com).

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre ZURZUVAE?

**ZURZUVAE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:**

**Reducción de la capacidad para conducir o realizar otras actividades peligrosas.** ZURZUVAE puede disminuir la conciencia y el estado de alerta, lo que puede afectar a su capacidad para conducir de forma segura o hacer otras actividades peligrosas

- **No** conduzca, no opere maquinaria ni realice otras actividades peligrosas **hasta al menos 12 horas después de tomar cada dosis** durante el curso de tratamiento de 14 días con ZURZUVAE
- Es posible que no pueda saber por su cuenta si puede conducir de forma segura o cuánto le está afectando ZURZUVAE

**Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 14-16, y la Información de Prescripción completa adjunta, incluyendo el Recuadro de Advertencia y la Guía del Medicamento.**

ZURZUVAE y el logotipo de ZURZUVAE son marcas comerciales de Sage Therapeutics autorizadas a Supernus Pharmaceuticals, Inc. BIOGEN y el logotipo de BIOGEN son marcas comerciales registradas de Biogen Inc. SUPERNUS PHARMACEUTICALS y el logotipo de SUPERNUS PHARMACEUTICALS son marcas comerciales registradas de Supernus Pharmaceuticals, Inc. Todas las demás marcas comerciales a las que se hace referencia en el presente documento son propiedad de sus respectivos dueños. ©2026 Supernus Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. ©2026 Biogen. Todos los derechos reservados. ZUR-US-1239v2 02/26